



U ranoj trudnoći postoje nesigurni, vjerljivi znakovi trudnoće, koji mogu biti simptom i nekih drugih stanja, stoga se ne treba previše oslanjati na njih, ali ukoliko su prisutni, osobito u većem broju, mogu pobuditi sumnju u trudnoću. Rani znakovi trudnoće različiti su kod žena, a kako ih prepoznati dr.med. Nataša Mihelčić Labura, spec. ginekologije i porodništva.

Izostanak/kašnjenje menstruacije

Vjerljivi je znak trudnoće, koji će kod većine žena pobuditi sumnju na trudnoću. Dvojbu oko trudnoće najbolje je riješiti rađenjem testa na trudnoću (određivanjem betaHCG u urinu ili krvi), te odlaskom na ginekološki pregled. Ukoliko se radi o trudnoći, test iz urina će biti pozitivan nakon izostanka menstruacije, dok će test iz krvi biti pozitivan ranije, već nekoliko dana nakon oplodnje. Implantacijsko krvarenje povezano je s "usađivanjem" oplođene jajne stanice u maternicu. Ponekad se ovo krvarenje može poklopiti s terminom očekivane menstruacije, što kod nekih žena može izazvati dvojbu. Najčešće je implantacijsko krvarenje manje obilno i kraćeg trajanja u odnosu na menstruaciju, ponekad tek naznačeno. S obzirom da krvarenje u ranoj trudnoći može biti i znak nekih komplikacija, najbolje je posjetiti ginekologa. Zbog usađivanja oplođene jajne stanice u maternicu, mogu se javiti kontrakcije, koje žena osjeća kao grčeve u donjem dijelu trbuha. Kod određenog broja žena grčevi se javljaju i u periodu PMS-a i za vrijeme menstruacije, no grčevi zbog implantacije su jačeg intenziteta. Ponekad, uz grčeve, prisutna je i bol u leđima (lumbalni dio kralješnice).

Mučnina i povraćanje

Mučnina je čest vjerljivi znak trudnoće. Za neke nepravedno nazvana "jutarnja" jer zna potrajati cijeli dan. Na mučninu se može nadovezati i povraćanje, različitog intenziteta. Dok lakši oblici ne zahtijevaju liječenje, kod težih je potrebna hospitalizacija. Iako postoji nekoliko teorija o nastanku mučnina i povraćanja, najviše prihvaćena teorija smatra da ovi simptomi nastaju zbog novog hormonskog statusa, posebno hormona koji se luči u trudnoći, betaHCG-a. S obzirom da je njegov vršak lučenja između 10.-12. tjedna trudnoće, nakon čega se vrijednosti smanjuju i ostaju niske do kraja trudnoće, tako i mučnine i povraćanje izlaskom iz prvog trimestra trudnoće za veliku većinu žena jenjavaju. Nepodnošenje određene hrane, kao i želja za točno određenom hranom, su znakovi koji vrlo rano mogu pobuditi sumnju na trudnoću.

Osjetljivost na mirise

Kao rani znak trudnoće može biti prisutno i nepodnošenje mirisa koji su se do trudnoće normalno podnosili (napr. miris jutarnje kave, paste za zube, parfema itd.), što je rezultat povećane količine estrogena u trudnoći.

Opstipacija i nadutost

Zatvor stolice i nadutost trbuha su rezultat hormonskih promjena u trudnoći. Progesteron, čija je glavna zadaća stvaranje optimalnih uvjeta za rast i razvoj bebe u maternici, relaksira mišićne niti maternice. Kod pojedinih trudnica njegovo sedirajuće djelovanje jače se očituje i na mišićne niti crijeva čime se probava usporava i dovodi do navedenih simptoma.

Povećanje dojki

U trudnoći se zbog hormonskog utjecaja mijenja tkivo dojki, postupno se pripremajući za dojenje. U ranoj trudnoći, kao nesigurni, vjerljivi znak, javlja se osjećaj topline u dojkama, napetost, pojačana osjetljivost, te ponekad izražajnija bolnost dojki. Iako se ovi simptomi javljaju kod nekih žena u okviru PMS-a, u ranoj trudnoći su naglašeniji. Ponekad se može uočiti i brzo tamnjenje areola dojke.

Učestalo mokrenje

Češće mokrenje danju, kao i mokrenje noću, može upućivati na trudnoću. Bubrezi trudnice počinju "pojačano" raditi, a maternica svojim rastom pritišće na mokračni mjehur. Važno je isključiti infekciju mokračnog mjehura. Povišena bazalna temperatura nastaje zbog utjecaja progesterona.

Porast bazalne temperature

U menstrualnom ciklusu, nakon ovulacije, zbog porasta razine progesterone dolazi i do porasta bazalne temperature. Ukoliko ne dođe do trudnoće, razina progesterone pada, a s njom i bazalna temperatura. Ukoliko do trudnoće dođe, progesteron je u porastu, a trudnica može imati temp do 37,5.

Promjene raspoloženja

Žene mogu iskusiti i umor, pospanost, vrtoglavicu, te rijetko nesvjesticu, kao rezultat hormonskih i neuro-vegetativnih promjena. Česte su i promjene raspoloženja, te glavobolja. Ukoliko je neizbjegljivo za glavobolju se u trudnoći može koristiti paracetamol.

dr. med. Nataša Mihelčić Labura, specijalist ginekologije i porodništva

/

[**Ordinacija.hr**](#)

VEZANI SADRŽAJI

{loadposition related}