

Paradontoza je glavni uzrok gubljenja zuba kod odraslih osoba. Postoji više stadija paradontoze. To su **gingivitis** odn. upala zubnog mesa, te rana i srednje napredna paradontoza. Upozoravajući znaci napredne paradontoze mogu biti crvena, natečena ili tkiva koja krvare, kao i **loš z dah**, te zubi koji se klimaju ili razdvaju i **p romjene u zagrizu**.

## Gingivitis



Ako se ne liječi infekcija tkiva oštećuje kost i potporna tkiva.

## Paradontoza



U ovom stadiju tkiva se još više odvajaju od zuba.

## Napredna paradontoza



U posljednjem stadiju dolazi do ispadanja zuba.

## Pregled kod paradontologa

Za vrijeme svakog rutinskog pregleda vaš stomatolog će provjeriti da li imate paradontozu. Prilikom pregleda se upotrebljava paradontozna sonda kako bi se utvrdilo stanje tkiva i da se provjeri da li su se stvorili džepovi između tkiva i zuba.

### Liječenje paradontoze

Liječenje ovisi o vrsti bolesti i stupnju napretka bolesti.





Oralna irigacija—  
usmjerava tekućinu  
ispod površine tkiva da  
uništi toksine i bakterije

~~Oralna irigacija— usmjerava tekućinu ispod površine tkiva da uništi toksine i bakterije~~

[Dental Flossing?](#) -- by eHow.com