



Pagetov karcinom bradavice dojke (lat. *Paget carcinoma mamillae*) je poseban oblik karcinoma dojke porijeklom od duktalnog epitela, koji se širi duž izvodnog kanala na površinu dojke, te infiltrira bradavicu i areolu dojke. Javlja se kod žena iznad 60. godine života. Bolest je dobila ime po *Sir James Pagetu*, engleskom kirurgu i patologu koji ju je prvi opisao 1875.g.

Simptomi

1. Trajno crvenilo, curenje i kraste na bradavici koje dovode do osipa i žarenja.
2. Rana na bradavici koja ne prolazi.
3. Obično je pogođena samo jedna bradavica.

Prvi simptom je obično ekcem kao osip, najčešće samo na jednoj bradavici. Koža bradavice i areola može biti crvena i upaljena, a bradavica okrenuta prema unutra (invertirana). Neke žene imaju svrbež ili osjećaj pečenja, prisustvo kraste, a iz bradavica ponekad curi iscjedak (fluid).

Simptomi obično počinju na bradavicama, a zatim se prošire na areole, te prsa. Tada simptomi nestaju na neko vrijeme i pacijentice često pomisle da je bolest izliječena, ali to nije točno. Većina žena ne posjeti liječnika jer pogrešno shvaćaju bolest kao kontaktni dermatitis ili ekcem. Ženama koje osjećaju kvržicu ili primijetite iritaciju kože koja se ne povuče za više od mjesec dana, preporuča se potražiti mišljenje stručnjaka.

Dijagnoza

Rak bradavice dojke

Nedjelja, 18 Travanj 2010 17:31



[Wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)