



U posljednjih 14 mjeseci već četvrta epidemiološka studija potvrđuje vezu između abortusa i pojave raka dojke. Najnovije istraživanje dokazalo je da abortus utrostručuje rizik od karcinoma dojke. Rezultati istraživanja provedenog na 300 žena pokazuju da one koje su izvršile abortus imaju tri puta veći rizik za razvoj tumora dojke kasnije u životu.

Proučavajući štiti li dojenje od razvoja karcinoma, znanstvenici su došli do ovog neočekivanog rezultata. Naime podaci su pokazali da dojenje doista značajno utječe na manji rizik od tumora i istovremeno uočili i da najveći rizik za razvoj raka dojke nosi abortus – čak više i od pojave menopauze i pušenja. Svoje istraživanje znanstvenici sa Sveučilišta Colombo u Sri Lanki objavili su u *Cancer Epidemiology*.

U posljednjih 14 mjeseci ovo je četvrta epidemiološka studija koja je potvrdila vezu između abortusa i raka dojke. Prijašnja istraživanja vodili su stručnjaci iz Kine, Turske i SAD-a. Professor Jack Scarisbrick, iz britanske udruge za savjetovalište trudnica "Life" rekao je: "Ova studija je još jedan dokaz da je abortus važan rizični faktor za pojavu tumora dojke."

No većina britanskih stručnjaka još nije uvjereni da je istraživanje točno jer se temeljilo na samo 300 osoba. Smatraju da su potrebne veće studije jer postoje i ona istraživanja koja spomenutu vezu nisu dokazala.

Oni koji istraživanje prihvaćaju smatraju da je za pojavu tumora odgovoran hormon estradiol, koji stimulira rast dojki tijekom trudnoće. Djelovanje je ublaženo kod žena koje rode, no razina hormona ostaje na vrlo visokoj razini ukoliko se odluče na abortus i prekinu trudnoću.

Od 1971. u Britaniji je, nakon ozakonjenja abortusa, došlo do 80% porasta raka dojke. A početkom godine dr. Louise Brinton, s američkog Nacionalnog instituta za tumore koja prije nije prihvaćala vezu između abortusa i raka dojke izjavila je da su ispitivanja ipak točna te da abortus povisuje rizik za nekih 40%.

[Danas.hr](#) / [Obiteljski.com](#)

